



POURQUOI ET COMMENT DIMINUER SA CONSOMMATION ALIMENTAIRE DE SEL

La **réduction de l'apport en sel** dans l'alimentation est un élément **important dans la prise en charge de certaines pathologies cardiovasculaires**.

Une consommation excessive sel favorise une augmentation de la tension artérielle chez les patients hypertendus; en cas d'insuffisance cardiaque le sel favorise la rétention d'eau sous forme d'œdèmes des jambes voire d'œdème pulmonaire responsable d'un essoufflement.

La consommation alimentaire moyenne de sel en France est de 8 à 12 g par jour.

Une alimentation "naturelle" sans ajout de sel ni aliment transformée apporte de 1,5 à 2 g de sel par jour.

Donc **la plus grande partie** du sel consommé est **rajoutée à la cuisine et à table** et surtout dans les **aliments transformés et les plats préparés** achetés dans le commerce (80 à 90%).

Voici des conseils pour vous aider à respecter votre régime pauvre en sel.



<http://www.cardiobreizh.com/>

LES APPORTS DE SEL CONSEILLÉS

En cas d'insuffisance cardiaque chronique

- Insuffisance cardiaque chronique **stable** : maximum de 6 g de sel / jour

Le niveau de restriction en sel doit être **individualisé pour chaque patient** et **revu à chaque consultation** selon les pathologies, l'examen et l'ensemble du traitement du patient, et en tenant compte du climat (assoupli en cas de canicule).

Un régime trop strict diminue la qualité de vie (manque d'appétit, dénutrition, contrariété) sans apporter de bénéfice supplémentaire.

En cas d'hypertension artérielle (sans insuffisance cardiaque)

- Une consommation modérée de sel est conseillée :
- consommation modérée de pain, fromage, charcuterie
 - limiter les aliments transformés riches en sel

<http://www.cardiobreizh.com/>



PRIVILÉGIER LES ALIMENTS PAUVRES EN SEL :



Légumes frais
ou surgelés naturels



Fruits frais,
compotes



Epices et aromates



Soupes maison



Viandes, poissons frais
ou surgelés nature ;
Noix de St Jacques,
crevettes frais
ou surgelés nature
Oeufs



Certaines eaux gazeuses :
Perrier, Thonon, Salvetat,
San Pellegrino (et eaux gazeuses
inférieur à 50 mg/l sodium)



Pâtes, riz,
pommes de terre



Légumes secs
Fruits secs sans sel



Pain & biscottes sans sel
pâtisseries maison
Boudoirs et paille d'or
Levure de boulanger



Laits, Laitages,
Fromage blanc



Beurre sans sel
margarine
crème fraîche



Sucres et
produits sucrés



Il existe des aliments diététiques ou de régime « à teneur en sodium réduite ou très réduite » (40 à 120 milligrammes de sodium pour 100 g d'aliment. Soit 100 à 300 mg de sel / 100 g) .

<http://www.cardiobreizh.com/>



EVITER LES ALIMENTS RICHES EN SEL



Le sel de table et le gros sel.
Éviter de mettre la salière à table




Charcuteries : jarret de porc, farce, knacki,
saucisse, saucisson, chorizo, jambon,
pâté, rillettes, andouille, boudin, lardons



Condiments et additifs : mayonnaise
ketchup, moutarde, barbecue, vinaigrette
du commerce, cornichons, sauce soja,
bouillon-Kub, court-bouillon, Viandox,
sel de céleri, levure chimique, nuok-man



Produits céréaliers du commerce :
Pain biscottes, viennoiseries,
biscuiteries, pâtisseries,
céréales pour petit déjeuner



toutes les conserves et plats
préparés : légumes, légumes
secs, anchois, thon ; soupe en
brique ou déshydratée en sachet.
Plats surgelés préparés
Pizza, hamburger, sandwich



Biscuits apéritifs / oléagineux :
cacahuètes salées, olives,
câpres, chips, chips de légumes



Mollusques, crustacés,
coquillages,
poissons fumés ou salés, terrines de poisson,
surimi, œufs de poisson, tarama, crevettes cuites



Tous les Fromages



Boissons : Vichy, Badoit, St Yorre,
Arvie, Apolinaris. Vais. Ouézac. Parot. Rozana.
Manon. Châteauneuf. Leclerc. jus de tomates



Beurre demi-sel salé
margarine salée



Médicaments effervescents
Pastilles Vichy, caramel au beurre salé



regardez les étiquettes des produits ;
1 g de sodium équivaut à 2,5 g de sel. 1 g de sel = 0,4 g sodium (Na)

<http://www.cardiobreizh.com/>





COMMENT APPORTER DU GOÛT SANS AJOUTER DE SEL ?



LES ÉPICES : poivre , curry , curcuma , safran , clou de girofle , muscade , paprika , piment , gingembre , cumin , anis
(attention ! les mélanges d'épices peuvent contenir du sel !)

LES AROMATES : thym , laurier , persil , ciboulette , basilic , coriandre , estragon , aneth , romarin , menthe

LES LÉGUMES AROMATIQUES : citron , tomate fraîche , échalote , ail , oignon , poivron , fenouil

GRÂCE AUX TECHNIQUES DE CUISSON :

- les poissons : en papillote , au micro-onde , à la poêle , sur le grill , à la vapeur ;
- les viandes : grillées , rôties , braisées , aromatisées aux herbes et épices ;
- les légumes : à la vapeur , à la poêle ;
- les féculents : à cuire avec un bouillon maison en y mettant un bouquet garni.

Ajouter à vos plats du **croquant** avec des graines de lin , pignons , amandes torréfiées.

VINAIGRETTE , SAUCES MAISON : marinades pour les viandes avec citron , épices , aromates et vinaigre , vinaigrette pour les légumes avec huile de noisette , vinaigre de Xérès , poire , pomme.

Des sauces préparées « sans sel » ou « à teneur réduite en sodium » sont commercialisées : Coulis de tomates , ketchup , moutarde , et cornichons

POUR LES APÉRITIFS :

Légumes croquants (radis , chou fleur , bâtonnets de légumes , tomates cerises)
accompagnés d'une sauce au fromage blanc agrémentée d'épices , d'aromates et citron.



Dans les « **sels de régimes** », le sel est souvent remplacé par du **chlorure de potassium** qui peut être nocif chez certains patients. Demandez l'avis de votre médecin.



<http://www.cardiobreizh.com/>



EN PRATIQUE

Alimentation à 6g de sel par jour (insuffisance cardiaque chronique stable) :

Sel de base = présent naturellement	2 g
Du pain salé (ou biscottes, pain grillé, ou galette de blé noir à la place du pain) 80 g max / jour	1 g
Le fromage (sauf ail et fines herbes, boursin, bleus) = 40g max / jour	1 g
Votre sel permis pour assaisonner en cuisson (2 pincées /jour)	1 g
1 Aliment au choix (voir le contenu en sel ci-dessous)	1 g
Total en sel / jour	6 g


















Evitez le cumul d'aliments ou préparations salés au même repas et sur la même journée.



Par exemple : si vous consommez 6 huîtres ou 1 saucisse, remplacer le même jour, le fromage par un yaourt.

<http://www.cardiobreizh.com/>

Il y a 1 g (1000 milligrammes) de sel dans :

2 pincées de sel 	6 huître (sans l'eau de mer) 	1 coquille StJacques cuisinée 1/3 plat préparé (plat entier équivaut = 3 à 4g de sel) 
1 sachet de sel de 1 g 	15 langoustines Cuites sans sel 	150 ml de potage en brique ou en sachet 
80 g de pain ou 8 biscottes 	1/2 litre de moules cuites sans sel 	160g de légumes en conserve 3 à 5 olives; 50 g cornichons; 50 g gâteaux apéritifs ou chips 
1 croissant ou autre viennoiserie de même poids 	100 à 125 g net égoutté de conserves de poisson (thon, sardine, maquereau 	2 galettes de blé noir sans garniture 
1 saucisse 	40 g de fromage (= 1/6ème de camembert) 	80 g de pizza ou quiche (1 portion de 200 g = 2.5 g)  1 part de tarte ou de gâteau maison
1 tranche de jambon de 50 g ou 1 tranche de jambon de Bayonne (35g) 	4 bâtonnets de surimi, 3 à 6 anchois 	Moutarde ou Ketchup : 1 cuillère à soupe rase (15g) 