

## MÉDICAMENTS UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE

<i>Famille et action</i>	<i>Nom de molécule</i>	<i>Nom commercial</i>	<i>Effets indésirables</i>
<b>Diurétiques</b> → augmentent l'élimination d'eau et de sel par les reins	furosemide bumétanide hydrochlorothiazide indapamide	Lasilix Burinex Esidrex Fludex	- baisse de la pression artérielle (hypotension) - baisse du sodium (hyponatrémie) - baisse du potassium (hypokaliémie) - déshydratation et insuffisance rénale
<b>antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes (ARM)</b> → réduisent l'accumulation d'eau et de sel, protège le cœur	spironolactone eplerenone	Aldactone Inspra	- hypotension, hyponatrémie, hyperkaliémie - gynécomastie (augmentation des seins, surtout spironolactone)
<b>Bêta-bloquants</b> → diminuent la fréquence des battements du cœur et sa contractilité et baissent (peu) la tension artérielle et ainsi réduit le travail du cœur	bisoprolol carvedilol metoprolol succinate nebivolol	Soprol, Bisocé Kredex Seloken Temerit	- ralentissement excessif du cœur (bradycardie) avec malaises ou essoufflement ou fatigue - aggravation asthme ou bronchite chronique sévère - acrosyndrome (extrémités froides et décolorées) - insuffisance érectile, cauchemards
<b>Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)</b> → relaxent les artères, baissent la tension artérielle, facilite le travail et diminuent la dégradation du cœur	ramipril enalapril lisinopril captopril	Triatec Renitec Zestril Lopril	- hyperkaliémie - hypotension surtout si patient déshydraté - insuffisance rénale si patient déshydraté - oedème angioneurotique (= oedème de Quincke) - toux sèche persistante (fréquent avec les IEC mais rare avec les sartans)
<b>Sartans</b> → relaxent les artères, baisse la tension artérielle, facilitent le travail et diminuent la dégradation du cœur	candesartan losartan valsartan	Atacand Cozaar Tareg	
<b>Sacubitril</b> → relaxe les artères, baissent la tension artérielle, font uriner (élimination d'eau et de sel). <b>Valsartan</b> → action d'un sartan	sacubitril-valsartan	Entresto	Comme les sartans mais hypotension plus fréquente
<b>Gliflozines</b> → Augmentent l'élimination de glucose, d'eau et de sel par les reins	dapagliflozine empagliflozine	Forxiga Jardiance	- mycoses génitales - hypoglycémie seulement avec insuline ou sulfamide - déshydratation en association avec un diurétique
<b>Ivabradine</b> → diminue la fréquence des battements du cœur (si le cœur est régulier)	ivabradine	Procoralan	- ralentissement excessif du cœur (bradycardie) avec malaises ou essoufflement ou fatigue
D'autres médicaments peuvent être <b>prescrits</b> pour prévenir la formation de caillots dans le sang, prévenir les troubles du rythme cardiaque, éviter les dépôts de cholestérol, baisser la tension artérielle, traiter le diabète.			
<b>Médicaments</b> habituellement <b>contre-indiqués</b> : diltiazem, verapamil, flecaïne, bepridil, anti-inflammatoires			